

# L'ALIMENTATION DES NOUVEAUX NÉS PORTEURS DE FENTES LABIO-PALATINE OU DIVISION PALATINE ISOLÉE

## FICHE D'INFORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

### POSITION DU BÉBÉ




- inclinaison de 40°
- bien dans l'axe avec appui au niveau des pieds
- enroulement au niveau du petit bassin
- tête bien maintenue sans hyperextension

### TÉTINES ET BIBERONS



- tétine souple de la maternité en silicone ou tétine souple en caoutchouc (de type Remond à vitesses) à faire bouillir
- agrandir l'orifice de la tétine afin d'augmenter le débit si besoin notamment les 1ers jours de vie
- positionner la tétine sur une lame palatine sur un plan dur (vomer), pas dans la fente pour permettre une meilleure vidange de la tétine par appui entre le plan dur et la langue

### L'ALIMENTATION



- laisser le bébé se caler sur son rythme : succion, déglutition, respiration
- si du lait passe par le nez, ce n'est pas grave cela peut arriver de façon intermittente
- contrôler le poids de l'enfant une fois par semaine
- éviter les sondes NG

## FICHE D'INFORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

### LA POSITION DU BÉBÉ

Il est important de positionner le bébé avec une inclinaison de 40° et de bien le placer dans l'axe avec un appui au niveau des pieds et un enroulement au niveau du petit bassin. La tête est bien maintenue sans hyperextension.

### TÉTINES ET BIBERONS

Il est fortement recommandé d'utiliser une tétine souple : soit la tétine de la maternité qui est en silicone, soit une tétine souple en caoutchouc (de type Remond à vitesse) que la famille a fait bouillir plusieurs fois afin de les assouplir.

Il est souvent nécessaire d'agrandir l'orifice de la tétine en période postnatale immédiate afin d'augmenter le débit.

Il faut veiller à positionner la tétine sur une lame palatine, sur un plan dur (vomer), pas dans la fente, pour permettre une meilleure vidange de la tétine par appui entre le plan dur et la langue. Si le bébé a un besoin de succion, ne pas hésiter à lui donner une sucette.

### L'ALIMENTATION

Laisser le bébé se caler sur son rythme : succion, déglutition, respiration.

Lorsque la tétée est efficace, le biberon se vide sans qu'il n'y ait de lait qui passe par le nez lors de la succion déglutition.

Si du lait passe par le nez, ce n'est pas grave cela peut arriver de façon intermittente. Il est nécessaire au début de contrôler le poids de l'enfant une fois par semaine.

### EVITER LES SONDES NASOGASTRIQUES

Dans le cadre des fentes isolées non syndromiques, il n'est pas conseillé de mettre une SNG car les bébés ont normalement toutes leurs capacités pour téter sans sonde. La sonde est quant à elle pourvoyeuse de reflux gastro-œsophagien.